



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та на підставі експертного висновку 16.02.2026 № 429-K/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 04.03.2026 № 270 зареєстровано:

продукт Дронтал™ Плюс XL зі смаком м'яса

форма Таблетки

Власник реєстраційного посвідчення:

Еланко ГмбХ

Хайнц-Ломан-Штр. 4, 27472 Куксхафен, НІМЕЧЧИНА

зареєстровано в Україні за № АА-06186-01-16 від 04.03.2026

Виробник:

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ

Проєнсдорфер стр. 324, 24106 Кіль, НІМЕЧЧИНА

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка препарату (додаток 2);
- етикетка (додаток 3).

Реєстраційне посвідчення дійсне до: 03.03.2031

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту.

Заступник Голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів –
Головний державний ветеринарний інспектор України

Deputy Head of the State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection – Chief State Veterinary Inspector of Ukraine



Володимир КУСТУРОВ

Volodymyr KUSTUROV

Коротка характеристика препарату

04.03.2026

1. Назва

Дронтал™ Плюс XL зі смаком м'яса

2. Склад

1 таблетка містить діючі речовини:

фебантел – 525 мг;

пірантелу ембонат – 504 мг;

празіквантел – 175 мг.

Допоміжні речовини: кукурудзяний крохмаль, моногідрат лактози, мікрокристалічна целюлоза, повідон K25, магнію стеарат, натрію лаурилсульфат, колоїдний діоксид кремнію, кроскармелоза натрію, м'ясний ароматизатор.

3. Фармацевтична форма

Таблетки.

4. Фармакологічні властивості

АТС *vet QP52 антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації).*

1. Фармакодинаміка

Дронтал™ Плюс XL зі смаком м'яса – антигельмінтик, ефективний проти круглих та стьожкових гельмінтів, а також лямблій. Містить діючі речовини: фебантел, пірантелу ембонат, празіквантел.

Комбінація діючих речовин *пірантелу* та *фебантелу*, що входять до складу препарату, мають синергічну дію проти нематод (токсокар, токскарід, унцинарій та анкілостом, волосоголовців) у собак: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, а також проти лямблій *Giardia spp.*

Празіквантел активний проти цестод у собак: *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus* та *Echinococcus multilocularis*. Празіквантел діє проти всіх кишкових стадій цих паразитів.

2. Фармакокінетичні властивості

Пірантел діє як холінергічний антагоніст ацетилхолінових рецепторів, викликаючи спастичний параліч круглих гельмінтів шляхом деполяризуючої нервово-м'язової блокади.

Антигельмінтна ефективність та лямбліоцидний ефект фебантелу зумовлений його здатністю гальмувати процес полімеризації тубуліну в мікроканальцях. У результаті структурних та функціональних метаболічних розладів виснажуються енергетичні запаси паразитів, внаслідок чого настає їх загибель на 2–3 добу.

Празіквантел швидко всмоктується через зовнішню оболонку стьожкових гельмінтів, внаслідок чого настає її пошкодження та скорочення. Це призводить до руйнування зовнішньої оболонки, розладів метаболізму і загибелі паразита.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Собаки.

5.2 Показання до застосування

Лікування собак при змішаних паразитарних інвазіях, спричинюваних гельмінтозами травного каналу:

- нематоди – *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*.
- цестоди – *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Mesocostoides spp.*

Лікування лямбліозу (*Giardia spp.*) у собак та цуценят.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати тваринам з гіперчутливістю до складників препарату.

04.03.2025

Не застосовувати собакам масою тіла, меншою за 7 кг.

Препарат не застосовують самкам у перші два триместри вагітності.

5.4 Побічна дія

У дуже рідкісних випадках (<1 з 10000) можливі легкі та швидкоминучі розлади шлунково-кишкового тракту (наприклад, блювота та діарея). Анорексія, млявість, гіперактивність.

5.5 Особливі застереження при використанні

Блохи слугують проміжними хазяїнами для стьожкових гельмінтів *Dipylidium caninum*, тому для запобігання повторного зараження тварин дипілідіозом слід вжити заходів щодо контролю переносників захворювань, а саме, блохи та миші, в оточенні тварини.

Для запобігання повторного зараження всі тварини, що утримуються разом, повинні проходити дегельмінтизацію одночасно.

Прибирання та гігієна після дегельмінтизації вкрай важливі для профілактики повторного зараження та розповсюдження інвазії. Слід вимити та продезінфікувати предмети, які можуть бути забруднені фекаліями.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Препарат не застосовують самкам у перші два триместри вагітності.

Застосування препарату протягом 3-х днів поспіл для лікування лямбліозу під час третього триместру вагітності повинно ґрунтуватися на оцінці лікарем ветеринарної медицини ризику та необхідності лікування.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовують одночасно з препаратами на основі піперазину.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Рекомендована доза – 1 таблетка на 35 кг маси тіла тварини (15 мг фебантелу, 14,4 мг пірантелу ембонату та 5 мг празиквантелу на 1 кг маси тіла).

Маса тіла, кг	Кількість таблеток
7–17,5	½
>17,5–35	1
>35–52,5	1 ½
>52,5–70	2

На кожні наступні 17,5 кг маси тіла застосовувати додатково половину таблетки.

Застосування: перорально, таблетку задають з кормом або без.

Застосування препарату не вимагає дотримання дієти.

Тривалість лікування: одноразово. При високому ступені інвазії шлунково-кишковими нематодами або при ехінококозі можлива необхідність повторного застосування (за призначенням лікаря ветеринарної медицини).

Лікування інвазій спричинених лямбліями (*Giardia* spp.): препарат застосовують три дні поспіл у рекомендованих дозах.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При передозуванні собакам та цуценятм рекомендованої дози препарату в 10 разів побічних реакцій не виявлено.

5.10 Спеціальні застереження

Часте використання антигельмінтних препаратів будь-якого класу може призвести до виникнення резистентності до діючої речовини.

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не визначають.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Після застосування препарату слід помити руки водою.

Giardia spp. може уражати людей, тому зверніться до лікаря, якщо у вашого собаки виявлене зараження лямбліями.

При випадковому заковтуванні препарату зверніться до лікаря та покажіть листівку-вкладку або етикетку до препарату.

04.03.2025

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Невідомо.

6.2 Термін придатності

4 роки.

Термін придатності після розкриття первинної упаковки з фольги (або розділених таблеток) – 7 діб.

6.3 Особливі заходи зберігання

Зберігати препарат у недоступному для дітей та тварин місці, за температури від 0 до 25 °С.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Блістери з фольги по 2, 4, 8, 24, 48 таблеток, запаковані в картонні коробки.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат та його залишки утилізують відповідно до чинного законодавства.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Еланко ГмбХ

Elanco GmbH

Хайнц-Ломан-Штр. 4

Heinz-Lohmann-Str. 4,

27472 Куксхафен, Німеччина

27472 Cuxhaven, Germany

8. Назва і місце знаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ

KVP Pharma and Veterinaer-Produkte GmbH

Проєнсдорфер стр. 324,

Projensdorfer Str. 324,

24106 Кіль, Німеччина

24106 Kiel, Germany

9. Додаткова інформація

04.03.2026

Дронтал™ Плюс XL зі смаком м'яса
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Таблетки у формі кісточки, від світло-коричневого до коричневого кольору зі смаком м'яса, поділені рискою на дві рівні частини з обох боків.

Склад

1 таблетка містить діючі речовини:

фебантел – 525 мг;

пірантелу ембонат – 504 мг;

празіквантел – 175 мг.

Допоміжні речовини: кукурудзяний крохмаль, моногідрат лактози, мікрокристалічна целюлоза, повідон К25, магнію стеарат, натрію лаурилсульфат, колоїдний діоксид кремнію, кроскармелоза натрію, м'ясний ароматизатор.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP52 антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації).

Фармакодинаміка

Дронтал™ Плюс XL зі смаком м'яса – антигельмінтик, ефективний проти круглих та стовжкових гельмінтів, а також лямблій. Містить діючі речовини: фебантел, пірантелу ембонат, празіквантел.

Комбінація діючих речовин *пірантелу* та *фебантелу*, що входять до складу препарату, мають синергічну дію проти нематод (токсокар, токсаскарид, унцинарій та анкілостом, волосоголовців) у собак: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, а також проти лямблій *Giardia* spp.

Празіквантел активний проти цестод у собак: *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus* та *Echinococcus multilocularis*. Празіквантел діє проти всіх кишкових стадій цих паразитів.

Фармакокінетичні властивості

Пірантел діє як холінергічний антагоніст ацетилхолінових рецепторів, викликаючи спастичний параліч круглих гельмінтів шляхом деполяризуючої нервово-м'язової блокади.

Антигельмінтна ефективність та лямбліоцидний ефект фебантелу зумовлений його здатністю гальмувати процес полімеризації тубуліну в мікроканальцях. У результаті структурних та функціональних метаболічних розладів виснажуються енергетичні запаси паразитів, внаслідок чого настає їх загибель на 2–3 добу.

Празіквантел швидко всмоктується через зовнішню оболонку стовжкових гельмінтів, внаслідок чого настає її пошкодження та скорочення. Це призводить до руйнування зовнішньої оболонки, розладів метаболізму і загибелі паразита.

Застосування

Лікування собак при змішаних паразитарних інвазіях, спричинюваних гельмінтозами травного каналу:

- нематоди – *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*.
- цестоди – *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Mesocostoides* spp.

Лікування лямбліозу (*Giardia* spp.) у собак та цуценят.

Дозування

Рекомендована доза – 1 таблетка на 35 кг маси тіла тварини (15 мг фебантелу, 14,4 мг пірантелу ембонату та 5 мг празіквантелу на 1 кг маси тіла).

Маса тіла, кг	Кількість таблеток
7–17,5	½

04.03.2025

>17,5–35	1
>35–52,5	1 ½
>52,5–70	2

На кожні наступні 17,5 кг маси тіла застосовувати додатково половину таблетки.

Застосування: перорально, таблетку задають з кормом або без.

Застосування препарату не вимагає дотримання дієти.

Тривалість лікування: одноразово. При високому ступені інвазії шлунково-кишковими нематодами або при ехінококозі можлива необхідність повторного застосування (за призначенням лікаря ветеринарної медицини).

Лікування інвазій спричинених лямбліями (*Giardia spp.*): препарат застосовують три дні поспіль у рекомендованих дозах.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з гіперчутливістю до складників препарату.

Не застосовувати собакам масою тіла, меншою за 7 кг.

Препарат не застосовують самкам у перші два триместри вагітності.

Застереження

Особливі застереження при використанні

Блохи слугують проміжними хазяїнами для стьожкових гельмінтів *Dipylidium caninum*, тому для запобігання повторного зараження тварин дипілідіозом слід вжити заходів щодо контролю переносників захворювань, а саме, блохи та миші, в оточенні тварини.

Для запобігання повторного зараження всі тварини, що утримуються разом, повинні проходити дегельмінтизацію одночасно.

Прибирання та гігієна після дегельмінтизації вкрай важливі для профілактики повторного зараження та розповсюдження інвазії. Слід вимити та продезінфікувати предмети, які можуть бути забруднені фекаліями.

Спеціальні застереження

Часте використання антигельмінтних препаратів будь-якого класу може призвести до виникнення резистентності до діючої речовини.

Побічна дія

У дуже рідкісних випадках (<1 з 10000) можливі легкі та швидкоминучі розлади шлунково-кишкового тракту (наприклад, блювота та діарея). Анорексія, млявість, гіперактивність.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовують одночасно з препаратами на основі піперазину.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Препарат не застосовують самкам у перші два триместри вагітності.

Застосування препарату протягом 3-х днів поспіль для лікування лямбліозу під час третього триместру вагітності повинно ґрунтуватися на оцінці лікарем ветеринарної медицини ризику та необхідності лікування.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Після застосування препарату слід помити руки водою.

Giardia spp. може уражати людей, тому зверніться до лікаря, якщо у вашого собаки виявлене зараження лямбліями.

При випадковому заковтуванні препарату зверніться до лікаря та покажіть листівку-вкладку або етикетку до препарату.

Форма випуску

Блістери з фольги по 2, 4, 8, 24, 48 таблеток, заповнені в картонні коробки.

Зберігання

Зберігати препарат у недоступному для дітей та тварин місці, за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності

4 роки.

Термін придатності після розкриття первинної упаковки з фольги (або розділених

04.03.2026

таблеток) – 7 діб.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Еланко ГмбХ
Хайнц-Ломан-Штр. 4
27472 Куксхафен, Німеччина

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4,
27472 Cuxhaven, Germany

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,
Проєнсдорфер стр. 324,
24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma and Veterinaer-Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
24106 Kiel, Germany

SuperPets

04.03.2026

80mm

53mm

Save without crop marks.

80mm

53mm

Save without crop marks.

FL513543X

Drontal™
Дронтал™
Плюс XL зі смаком м'яса
1 таблетка містить:
525 мг (mg) фебантелу
504 мг (mg) пірантелу ембонат
175 мг (mg) празіквантелу
Проти круглих, стовжкових гельмінтів та лямблій
1  таблетка на 35 кг (kg) маси тіла
Містить 2 таблетки
Для застосування у ветеринарній медицині!
(1) Серія: CLOTJ
(2) Придатний до: CEXPJ
(3)



For Variable Code:
• Pattern are left aligned
• Text height can be increased
• Minimum for the variable data area is 10mm for that height. Data can be printed 800-880-XXXX
• X-RTD can be removed if not required. LTR and DTP are in same position.

LEGEND KEY

Template: FL_93x58mm_NAPA_v4a_2

Text Field Area

Variable Data and Code area

50 mm Rule Bar

PRODUCT INFO

BLUE #	S13543AP	Product Name	Drontal Plus Flavour XL Dog (DP 90)
Item Code	FL513543X	Component	Blister Foil & Sachets
Product Code	N/A	Pack Size	2 Count
Previous Item Code	90213231		

ARTWORK INFO

Template	FL_93x58mm_NAPA_v4a_2	Packaging Speed	TPM_017954
Barcode Type	N/A	Art. Info	N/A
GTIN	GTIN Not Required	Minimum Core Data Print Size	10pt
Proof #	F1a	By Date	25 04-2026

BLACK

NON-PRINTING

ELANCO ARTWORK LEGEND v18



BLUE #:	513543AP	Product Name:	Drontal Plus Flavour XL Dog (DP 90)
Item Code:	SH513543X	Component:	Carton
Product Code:	N/A	Pack Size:	2 Count
Previous Item Code	90213137		

Template:	CA_90x20x100mm_v2b	Packaging Spec(s):	TPM_017933		
Barcodes/Type:	EAN 13: 4007221053408 Pharmacode: 23	Add. Info:	N/A		
		Minimum Core Data Point Size:	7p		
GTIN:	04007221053408	Proof #	P1a		
		By/Date	JS 06-JAN-2024		
CYAN	MAGENTA	YELLOW	BLACK	PMS 724C	NON PRINTING

ELANCO ARTWORK LEGEND v16

Figure 1 shows a 50 mm rule bar with three distinct regions: Text Free Area, Print Free Area, and Variable Data and Code area.