



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та на підставі експертного висновку 21.07.2025 № 307-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 11.08.2025 № 846 зареєстровано:

продукт МЕГАСТОП для котів

форма Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, УКРАЇНА

зареєстровано в Україні за № АВ-05888-03-15 від 11.08.2025

Виробник:

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, УКРАЇНА

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:


- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка препарату (додаток 2);
- етикетка (додаток 3).

Реєстраційне посвідчення дійсне до: 10.08.2030

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту.

Заступник Голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів –
Головний державний ветеринарний інспектор України

Deputy Head of the State Service of Ukraine on Food Safety and
Consumer Protection – Chief State Veterinary Inspector of Ukraine



Володимир КУСТУРОВ

Volodymyr KUSTUROV

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів



The State Service of Ukraine on Food Safety and
Consumer Protection

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
КОНТРОЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНИХ
ПРЕПАРАТІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК

STATE SCIENTIFIC RESEARCH CONTROL
INSTITUTE OF VETERINARY MEDICAL
PRODUCTS AND FEED ADDITIVES

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ
ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК

AGENCY OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS
AND FEED ADDITIVES

вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019
тел.: (032) 252 82 84; факс: (032) 252 11 93
e-mail: agency@scivp.lviv.ua www.scivp.lviv.ua
ЄДРПОУ 00485670

Donetska str., 11, Lviv, 79019, Ukraine
tel.: +38 032 252 82 84; fax: +380 32 252 11 93
e-mail: agency@scivp.lviv.ua www.scivp.lviv.ua
EDRPOU 00485670

21.07.2025 № 307-K/06

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА УКРАЇНИ

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я», УКРАЇНА

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами наукової експертизи реєстраційного досьє та аналітичних випробувань препарату
МЕГАСТОП для котів
власник ТОВ «НВП «СУЗІР'Я», (УКРАЇНА)
виробник ТОВ «НВП «СУЗІР'Я», (УКРАЇНА)
згідно з контрактом № 118 від 14.04.2025 р.

За результатами проведеної наукової експертизи реєстраційного досьє та випробувань
препарату МЕГАСТОП для котів, Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення,
власник ТОВ «НВП «СУЗІР'Я», (УКРАЇНА), виробник ТОВ «НВП «СУЗІР'Я», (УКРАЇНА)
рекомендовано його перереєстрацію в Україні.

Реєстраційне посвідчення: АВ-05888-03-15

**Директор Інституту,
д.вет.наук, професор,
член-кореспондент НААН**

Володимир СТИБЕЛЬ

**Голова Агентства,
доктор філософії**

Микола ВЕРХОЛЮК

11.08.2025

Коротка характеристика препарату

1. Назва

МЕГАСТОП для котів

2. Склад

1 мл препарату містить діючі речовини (мг):

імідаклоприд – 100,0;

івермектин – 10,0.

Допоміжні речовини: Н-метилпіролідон, диметилсульфоксид, кислота лимонна, поліетиленгліколь 400.

3. Фармацевтична форма

Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення.

4. Фармакологічні властивості

АТС vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX30, комбінації інших ектопаразитицидів для місцевого застосування)

МЕГАСТОП для котів - ендоектопаразитицид. Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин.

Імідаклоприд, діюча речовина препарату, належить до групи хлорнікотинілових сполук. Блокує постсинаптичні холінергічні рецептори, які чутливі до нікотину і розміщені у ектопаразитів у центральній нервовій системі. Переривання передачі нервового імпульсу призводить до паралічу та загибелі паразиту.

Імідаклоприд має низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому практично не впливає на ЦНС ссавців.

Івермектин належить до сполук, що продукуються мікроорганізмами групи *Streptomyces avermitilis*. Івермектин має виражену протипаразитарну дію на личинкові і статевозрілі форми нематод. Механізм дії івермектину на організм паразита полягає у тому, що він стимулює виділення нейромедіатора гальмування, гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), у пресинаптичних нейронах, який зв'язується зі спеціальними рецепторами нервових закінчень, збільшуючи проникність мембран для іонів хлору і блокуючи передачу нервово-м'язових імпульсів. Це призводить до порушення передачі нервових імпульсів, паралічу і загибелі паразитів.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коти.

5.2 Показання до застосування

Лікування котів за уражень ектопаразитами та профілактика уражень: блохами (*Ctenocephalides* spp.), саркоптиформними кліщами (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*, *Sarcoptes canis*), тромбідіформними кліщами (*Demodex* spp.); профілактика дирофіляріозу (ефективний проти личинок L3 і L4 стадії *Dirofilaria immitis*).

5.3 Протипоказання

Не застосовують хворим і ослабленим тваринам!

Не застосовують кошенятам віком до 12 тижнів!

Не застосовують тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Застосування препарату тваринам масою тіла до 1 кг повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Використання препарату під час вагітності та лактації ґрунтується на оцінці ризику і необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини.

5.4 Побічна дія

Після застосування препарату у тварин іноді виникають симптоми побічної дії такі, як короточасний свербіж, еритеми на шкірі, ознаки засалювання шерсті, які швидко проходять.

При злизуванні твариною препарату після нанесення виникає посилене слиновиділення та

.11.08.2025

блювання і ознаки нервових розладів. Ці розлади швидко проходять без проведення терапії.

У дуже рідких випадках дія препарату може спричинити такі зміни у поведінці як апатичність, збудження та втрата апетиту.

5.5 Особливі застереження при використанні

Під час обробки тварин уникати потрапляння препарату в очі, ротову порожнину.

Не допускати контакту щойно оброблених тварин з іншими тваринами!

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Використання препарату під час вагітності та лактації ґрунтується на оцінці ризику та необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з іншими протипаразитарними макроциклічними лактонами.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Для котів різної маси тіла використовують піпетки відповідного об'єму:

Маса тіла тварин (кг)	Розмір піпетки	Об'єм (мл)	Кількість піпеток
до 4	для малих котів	0,5	1
від 4 до 8	для великих котів	1,0	1
більше 8		Відповідна комбінація піпеток	

Порядок застосування:

Препарат застосовувати лише зовнішньо. На ділянці шиї біля основи черепа розгорнути шерстний (волосяний) покрив тварини, щоб видно було шкіру. Розмістити вузький кінець піпетки на шкірі, міцно стиснути піпетку декілька разів, нанести весь вміст безпосередньо на шкіру. Препарат наносити на неушкоджену шкіру.

За отодектозу, нотоєдрозу, саркоптозу та демодекозу обробку проводити 2-3 рази з інтервалом у 10 діб.

Тварин не купати впродовж 48 годин після обробки препаратом. Тривалість дії препарату становить 1,5 - 2 місяці.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При передозуванні препарату у 10 разів дорослим котам та у 5 разів кошенятам симптомів передозування не спостерігали.

5.10 Спеціальні застереження

Препарат наносять лише на неушкоджену поверхню шкіри.

Під час обробки тварин уникати потрапляння препарату в очі, ротову порожнину. Не допускати контакту щойно оброблених тварин з іншими тваринами!

Використання препарату під час вагітності та лактації ґрунтується на оцінці ризику та необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини.

Часте використання шампуню після обробки тварин зменшує ефективність препарату.

При виникненні ознак побічної дії препарат змивають водою з шампунем і за порадою лікаря ветеринарної медицини застосовують альтернативний ветеринарний лікарський засіб.

Не застосовувати одночасно з іншими протипаразитарними макроциклічними лактонами.

5.11 Період виведення (каренція)

Не визначають для непродуктивних тварин.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При роботі з препаратом дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами. Під час обробки тварин забороняється палити, пити і приймати їжу.

При випадковому потрапленні препарату на шкіру, слизові оболонки або очі необхідно ретельно промити їх проточною водою.

Якщо подразнення слизових оболонок або шкіри не усувається, необхідно звернутися до лікаря.

.11.08.2025

Після роботи з препаратом необхідно ретельно вимити руки.

Власники тварин із гіперчутливістю до складників препарату обробку тварин повинні проводити у гумових рукавицях.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Не встановлені.

6.2 Термін придатності

3 роки.

6.3 Особливі заходи зберігання

Препарат зберігають у закритій упаковці виробника в сухому, недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів за температури від 0 до 30 °С.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Полімерні піпетки по:

0,5 мл - для котів малих порід масою тіла до 4 кг;

1,0 мл - для котів великих порід масою тіла від 4 до 8 кг.

Полімерні піпетки упаковані у картонні коробки по 1, 4 та 40 шт.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний або протермінований препарат утилізують відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.

+38(057) 766-36-36

8. Назва і місце знаходження виробника

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.

info@provet.ua

provet.ua

9. Додаткова інформація

МЕГАСТОП для котів
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
листівка-вкладка

Опис

Прозора масляниста рідина зі специфічним запахом складових компонентів.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини (мг):

імідаклоприд – 100,0;

івермектин – 10,0.

Допоміжні речовини: Н-метилпіролідон, диметилсульфоксид, кислота лимонна, поліетиленгліколь 400.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX30, комбінації інших ектопаразитицидів для місцевого застосування)

МЕГАСТОП для котів - ендоектопаразитицид. Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин.

Імідаклоприд, діюча речовина препарату, належить до групи хлорнікотинілових сполук. Блокує постсинаптичні холінергічні рецептори, які чутливі до нікотину і розміщені у ектопаразитів у центральній нервовій системі. Переривання передачі нервового імпульсу призводить до паралічу та загибелі паразиту.

Імідаклоприд має низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому практично не впливає на ЦНС ссавців.

Івермектин належить до сполук, що продукуються мікроорганізмами групи *Streptomyces avermitilis*. Івермектин має виражену протипаразитарну дію на личинкові і статевозрілі форми нематод. Механізм дії івермектину на організм паразита полягає у тому, що він стимулює виділення нейромедіатора гальмування, гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), у пресинаптичних нейронах, який зв'язується зі спеціальними рецепторами нервових закінчень, збільшуючи проникність мембран для іонів хлору і блокуючи передачу нервово-м'язових імпульсів. Це призводить до порушення передачі нервових імпульсів, паралічу і загибелі паразитів.

Застосування

Лікування котів за уражень ектопаразитами та профілактика уражень: блохами (*Ctenocephalides* spp.), саркоптиформними кліщами (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*, *Sarcoptes canis*), тромбідиформними кліщами (*Demodex* spp.); профілактика дирофіляріозу (ефективний проти личинок L3 і L4 стадії *Dirofilaria immitis*).

Дозування

Для котів різної маси тіла використовують піпетки відповідного об'єму:

Маса тіла тварин (кг)	Розмір піпетки	Об'єм (мл)	Кількість піпеток
до 4	для малих котів	0,5	1
від 4 до 8	для великих котів	1,0	1
більше 8		Відповідна комбінація піпеток	

Порядок застосування:

Препарат застосовувати лише зовнішньо. На ділянці шиї біля основи черепа розгорнути шерстний (волосяний) покрив тварини, щоб видно було шкіру. Розмістити вузький кінець піпетки на шкірі, міцно стиснути піпетку декілька разів, нанести весь вміст безпосередньо на шкіру. Препарат наносити на неушкоджену шкіру.

За отодектозу, нотоедрозу, саркоптозу та демодекозу обробку проводити 2-3 рази з інтервалом у 10 діб.

Тварин не купати впродовж 48 годин після обробки препаратом. Тривалість дії препарату

11.08.2025

становить 1,5 - 2 місяці.

Протипоказання

Не застосовують хворим і ослабленим тваринам!

Не застосовують кошенятам віком до 12 тижнів!

Не застосовують тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Застосування препарату тваринам масою тіла до 1 кг повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Використання препарату під час вагітності та лактації ґрунтується на оцінці ризику і необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Застереження

Препарат наносити лише на неушкоджену поверхню шкіри.

Під час обробки тварин уникати потрапляння препарату в очі, ротову порожнину.

Не допускати контакту щойно оброблених тварин з іншими тваринами!

При роботі з препаратом дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Часте використання шампуню після обробки тварин зменшує ефективність препарату.

При виникненні ознак побічної дії препарат змити водою з шампунем і за порадою лікаря ветеринарної медицини застосовувати альтернативний ветеринарний лікарський засіб.

Не застосовувати одночасно з іншими протипаразитарними макроциклічними лактонами.

Форма випуску

Полімерні піпетки по:

0,5 мл - для котів малих порід масою тіла до 4 кг;

1,0 мл - для котів великих порід масою тіла від 4 до 8 кг.

Полімерні піпетки упаковані у картонні коробки по 1, 4 та 40 шт.

Зберігання

Зберігати препарат у закритій упаковці виробника, в сухому недоступному для дітей та тварин місці окремо від харчових продуктів та кормів за температури від 0 до 30 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Полтавський Шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.

+38(057) 766-36-36

Виробник готового продукту


ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.

info@provet.ua

provet.ua

11.08.2025



PROVET

**МЕГА
СТОП**

КОМПЛЕКСНИЙ
ПРОТИПАРАЗИТАРНИЙ ПРЕПАРАТ

до 4 kg (кг) 1 шт. 0,5 ml (мл)

ВІД БЛІХ • КЛІЩІВ • НЕМАТОД • ДИРОФІЛЯРІЙ

**МЕГА
СТОП**

МЕГАСТОП для котів
Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення

Склад: 1 ml (мл) препарату містить діючі речовини:
імідаклоприд - 100 mg (мг);
івермектин - 10 mg (мг).

Допоміжні речовини: Н-метилпіролідон, диметилсульфоксид, лимонна кислота, поліетиленгліколь-400.

Піпетки препарату МЕГАСТОП для котів відповідно до маси тіла містять:

Розмір піпетки	Об'єм, ml (мл)	Імідаклоприд, mg (мг)	Івермектин, mg (мг)
для малих котів (до 4 kg (кг))	0,5	50	5
для великих котів (від 4 до 8 kg (кг))	1,0	100	10

Застосування. Профілактика та лікування тварин при ураженні
• блохами (*Ctenocephalides spp.*);
• саркоптиформними кліщами (*Otodectes cynotis, Notoedres cati, Sarcoptes scabiei*);
• трематодформними кліщами (*Demodex spp.*);
• профілактика дирофіляриозу (ефективний проти личинок L3 і L4 стадії *Dirofilaria immitis*).

Дозування. Застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Протипоказання. Не застосовують хворим і ослабленим тваринам!
Не застосовують кошенятам віком до 12-тижнів!
Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до складників!
Застосування препарату тваринам масою тіла до 1 kg (кг) повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Використання препарату під час вагітності та лактації ґрунтується на оцінці ризику і необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Форма випуску. Полімерні піпетки по 0,5 ml (мл) для малих котів масою тіла до 4 kg (кг) у картонному пакуванні по 1 шт.

Зберігання. Зберігати препарат у сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30°C.

Термін придатності. 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення
ТОВ «НВП «СУЗІРЯ»,
вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.
+38(057) 766-36-36



Виробник готового продукту
ТОВ «НВП «СУЗІРЯ»,
вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.
info@provet.ua
provet.ua

Прямий зв'язок з виробником: 0 (800)21-23-40

ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ!

Art. (Art.) PR241747
РП: АВ-05888-03-15


Серія:
Придатний до:

4 823082 417476


1 1. 0 8. 2025




PROVET



МЕГА СТОП

КОМПЛЕКСНИЙ
ПРОТИПАРАЗИТАРНИЙ ПРЕПАРАТ



 4 - 8 kg (кг)  1 шт.  1,0 ml (мл)

ВІД БЛІХ • КЛІЩІВ • НЕМАТОД • ДИРОФІЛЯРІЙ

МЕГА СТОП

МЕГАСТОП для котів
Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення

Склад: 1 ml (мл) препарату містить двічі речовини:
імідаклоприд - 100 mg (мг);
івермектин - 10 mg (мг).

Допоміжні речовини: Н-метилпіпролідон, диметилсульфоксид, лимонна кислота, поліетиленгліколь-400.

Піпетки препарату МЕГАСТОП для котів відповідно до маси тіла містять:

Розмір піпетки	Об'єм, ml (мл)	Імідаклоприд, mg (мг)	Івермектин, mg (мг)
для малих котів (до 4 kg (кг))	0,5	50	5
для великих котів (від 4 до 8 kg (кг))	1,0	100	10

Застосування. Профілактика та лікування тварин при ураженні
• блохами (*Ctenocephalides spp.*);
• саркоптіформними кліщамми (*Otodectes cynotis, Notoedres cati, Sarcoptes canis*);
• тромбідіформними кліщамми (*Demodex spp.*);
• профілактика дирофіляріозу (ефективний проти личинок L3 і L4 стадії *Dirofilaria immitis*).

Дозування. Застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Протипоказання. Не застосовують хворим і ослабленим тваринами!
Не застосовують кошенятам віком до 12-тижнів!
Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до складників!
Застосування препарату тваринам масою тіла до 1 kg (кг) повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Використання препарату під час вагітності та лактації ґрунтується на оцінці ризику і необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Форма випуску. Полімерні піпетки по 1,0 ml (мл) для великих котів масою тіла від 4 до 8 kg (кг) у картонному пакуванні по 1 шт.

Зберігання. Зберігати препарат у сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30 °С.

Термін придатності. 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення
ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,
вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.
+38(057) 766-36-36


Виробник готового продукту
ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»
вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна
info@proveta.ua
proveta.ua
Прямий зв'язок з виробником: 0-(800)21-23-40




ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ!

Art. (Art.) PR241746
РП: АВ-05888-03-15

Серія:
Придатний до:





4 823082 417469

ЗДОРОВ'Я УЛЮБЛЕНЦІВ - БЕЗПЕКА ВЛАСНИКІВ



МЕГА
СТОП

PROVET

РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО
ЗАСТОСУВАННЯ, ТОЧКОВОГО
НАНЕСЕННЯ

МЕГАСТОП для котів

Склад: 1 ml (мл) препарату містить діючі речовини:
Імідаклоприд - 100 mg (мг);
Івермектин - 10 mg (мг).

Допоміжні речовини: Н-метилпіролдон, диметилсульфоксид, лимонна кислота, поліетиленгліколь-400.

Піпетки препарату МЕГАСТОП для котів відповідно до маси тіла містять:

Розмір піпетки	Об'єм, ml (мл)	Імідаклоприд, mg (мг)	Івермектин, mg (мг)
для малих котів (до 4 kg (кг))	0,5	50	5
для великих котів (від 4 до 8 kg (кг))	1,0	100	10

Застосування. Профілактика та лікування тварин при ураженні:
• блохами (*Ctenocephalides spp.*);
• саркоптиформними кліщами (*Otodectes cynotis, Notoedres cati, Sarcoptes canis*);
• тромбідформними кліщами (*Demodex spp.*);
• профілактика дирофіляріозу (ефективний проти личинок L3 і L4 стадії *Dirofilaria immitis*).

Дозування. Застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Протипоказання. Не застосовують хворим і ослабленим тваринам!
Не застосовують кошенятам віком до 12-тижнів!
Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до складників!
Застосування препарату тваринам масою тіла до 1 kg (кг) повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Використання препарату під час вагітності та лактації ґрунтується на оцінці ризику і необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Форма випуску. Полімерні піпетки по 0,5 ml (мл) для малих котів масою тіла до 4 kg (кг) упаковані у картонні коробки по 4 шт.

Зберігання. Зберігати препарат у сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30°C.

Термін придатності. 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення
ТОВ «ПЕТ-СУБ'ЄКТ»
вул. Подільський шлях, 115, м. Харків, 61053,
Україна
+38(057) 766 36 36
Прямий зв'язок з виробником: 01-800021-23-40

Виробник готового продукту
ТОВ «ПЕТ-СУБ'ЄКТ»
вул. Зернова, с. м. Харків, 61105, Україна.
info@proveta.ua

proveta.ua



ЗДОРОВ'Я УЛЮБЛЕНЦІВ - БЕЗПЕКА ВЛАСНИКІВ

PROVET



МЕГА
СТОП

КОМПЛЕКСНИЙ ПРОТИПАРАЗИТАРНИЙ
ПРЕПАРАТ



до 4 kg (кг)



4 шт.



0,5 ml (мл)



ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ!

ВІД БЛІХ • КЛІЩІВ • НЕМАТОД • ДИРОФІЛЯРІЙ



4 823082 409822

Серія: Придатний до:

11.08.2025

4 - 8 kg (кг) 1,0 ml (мл)

MEGA STOP

PROVET

MEGA STOP

PROVET

РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО
ЗАСТОСУВАННЯ, ТОЧКОВОГО
НАНЕСЕННЯ

MEGA STOP для котів

Склад: 1 ml (мл) препарату містить діючі речовини:
Імідаклоприд - 100 mg (мг);
Івермектин - 10 mg (мг).

Допоміжні речовини: Н-метилпіролідон, диметилсульфоксид, лимонна кислота, поліетиленгліколь-400.

Піпетки препарату МЕГАСТОП для котів відповідно до маси тіла містять:

Розмір піпетки	Об'єм, ml (мл)	Імідаклоприд mg (мг)	Івермектин mg (мг)
для малих котів (до 4 kg (кг))	0,5	50	5
для великих котів (від 4 до 8 kg (кг))	1,0	100	10

Застосування. Профілактика та лікування тварин при ураженні
• блохами (*Ctenocephalides spp.*);
• саркоптіформними кліщами (*Otodectes cynotis, Notoedres cati, Sarcoptes canis*);
• тромбідіформними кліщами (*Demodex spp.*);
• профілактика дирофіляріозу (ефективний проти личинок L3 і L4 стадії *Dirofilaria immitis*).

Дозування. Застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Протипоказання. Не застосовують хворим і ослабленим тваринами!
Не застосовують кошенятам віком до 12-тижнів!
Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до складників!
Застосування препарату тваринам масою тіла до 1 kg (кг) повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Використання препарату під час вагітності та лактації ґрунтується на оцінці ризику і необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Форма випуску. Полімерні піпетки по 1,0 ml (мл) для великих котів масою тіла від 4 до 8 kg (кг) упаковані у картонні коробки по 4 шт.

Зберігання. Зберігати препарат у сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30°C.

Термін придатності. 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення
ТОВ «ІНТІ-СІДП»
вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61053,
Україна
+38(057) 786-36-36
Прямий за'явок з виробником: 041600271-23-40

Виробник готового продукту
ТОВ «ІНТІ-СІДП»
вул. Зарвська, 4, м. Харків, 61105, Україна
info@provvet.ua
provvet.ua

Art. (Art.) PR020074
РП: АВ-05888-03-15

PROVET

ЗДОРОВ'Я УЛЮБЛЕНЦІВ - БЕЗПЕКА ВЛАСНИКІВ

PROVET

ЗДОРОВ'Я УЛЮБЛЕНЦІВ - БЕЗПЕКА ВЛАСНИКІВ

MEGA STOP

PROVET

КОМПЛЕКСНИЙ ПРОТИПАРАЗИТАРНИЙ
ПРЕПАРАТ

4 - 8 kg (кг) 4 шт. 1,0 ml (мл)

ВІД БЛІХ • КЛІЩІВ • НЕМАТОД • ДИРОФІЛЯРІЙ

Лише для ветеринарної медицини!

Серія: Придатний до:

4 823082 409839

11.08.2025

МЕГАСТОП для котів 0,5 мл

імідаклоприд – 100,0 мг/мл

івермектин – 10,0 мг/мл

Серія: Придатний до:

МЕГАСТОП для котів 1,0 мл

імідаклоприд – 100,0 мг/мл

івермектин – 10,0 мг/мл

Серія: Придатний до: