



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та на підставі експертного висновку 30.08.2023 № 208-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 07.09.2023 № 673 зареєстровано:

продукт PROFILINE краплі протипаразитарні

форма Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, УКРАЇНА

зареєстровано в Україні за № AB-07790-03-18 від 07.09.2023

Виробник:

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, УКРАЇНА

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка препарату (додаток 2);
- етикетка (додаток 3).

Реєстраційне посвідчення дійсне до: 06.09.2028

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту.



07.09.2023

Коротка характеристика препарату

1. Назва

PROFILINE краплі протипаразитарні

2. Склад

1,0 мл препарату містить діючі речовини (мг):

фіпроніл – 100,0;

S-метопрен – 100,0.

Допоміжні речовини: пропіленкарбонат; спирт ізопропіловий; пропіленгліколь.

3. Фармацевтична форма

Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення.

4. Фармакологічні властивості

АТС vet QP53, ектопаразитоциди, інсектициди і репеленти (QP53AX65, фіпроніл комбінації).

PROFILINE краплі протипаразитарні це комбінований інсектоакарицидний ветеринарний препарат. Має виражену дію до преімагінальних та імагінальних фаз розвитку бліх (*Ctenocephalides* spp.), вошей (*Linognathus* spp.), волосоїдів (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) та іксодових кліщів (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp.), які паразитують на тілі собак і котів.

Механізм дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводять до ураження нервової системи ектопаразитів і їх загибелі. Фіпроніл не впливає на центральну нервову систему тварин.

S-метопрен – аналог ювенільного гормону, який діє як регулятор росту комах і пригнічує ріст та морфологічний розвиток їх на стадіях яйця, личинки і лялечки завдяки антагонізму з екдизоном, який відповідає за ріст та розвиток личинки.

Овоцидна дія S-метопрену проявляється в результаті прямого проникнення в оболонку відкладених яєць.

Препарат належить до малотоксичних для теплокровних тварин речовин і в рекомендованих дозах не проявляє ембріотоксичної і тератогенної дії.

5. Клінічні особливості

5.1. Вид тварин

Собаки, коти

5.2. Показання до застосування

Профілактика і лікування собак та котів при ураженні ектопаразитами:

- блохами (*Ctenocephalides* spp.),
- іксодовими кліщами (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp.),
- вошами (*Linognathus* spp.),
- волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*).

Запобігає розмноженню бліх гальмуванням розвитку яєць (овоцидна активність), личинок і лялечок (ларвоцидна активність).

Профілактика та лікування собак і котів при блошиному алергічному дерматиті.

5.3. Протипоказання

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати цуценят та кошенят віком до 8 тижнів!

Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

5.4. Побічна дія

В місці нанесення препарату можливе незначне склеювання шерсті або ознаки засалювання шерсті, які швидко проходять; не часто слабо виражена реакція шкіри (свербіж, випадання шерсті, почервоніння шкіри). У випадку злизування твариною препарату можливе слиновиділення, блювання та ознаки нервових розладів.

У разі збереження побічної дії зверніться по допомогу до ветеринарного лікаря.

07.09.2023

5.5. Особливі застереження при використанні

Важливо переконатися, що препарат нанесений на ділянки тіла, які недоступні для злизування твариною.

Не допускати можливості облизування тваринами одне одного після обробки ветеринарним лікарським засобом.

Не рекомендують купати тварин впродовж 2-х діб після обробки ветеринарним препаратом.

Блохи від домашніх тварин часто інфікують спальні місця та інші місця перебування тварин такі як, килими і м'які меблі, тому їх необхідно періодично чистити і обробляти відповідними інсектицидними засобами. Препарат може викликати подразнення слизових оболонок, шкіри та очей. Тому не можна допускати потрапляння препарату всередину, на шкіру та в очі.

Людям із гіперчутливістю до інсектицидів або спирту не рекомендують обробляти тварин препаратом.

Не допускати потрапляння препарату на відкриті ділянки тіла (на пальці). При попаданні препарату на руки необхідно змити його водою з милом.

При випадковому попаданні препарату в очі необхідно обережно промити їх чистою водою.

Після обробки тварин препаратом необхідно ретельно вимити руки водою з милом.

Під час роботи з препаратом забороняється пити, вживати їжу або палити.

Після обробки препаратом тварин необхідно утримувати окремо до повного висихання і не допускати до них маленьких дітей. Не рекомендують обробляти тварин препаратом впродовж дня, це краще робити ввечері. Не дозволяти тваринам після обробки препаратом спати з господарями, особливо з дітьми.

5.6. Використання під час вагітності, лактації

Застосування препарату тваринам під час вагітності і лактації ґрунтується на оцінці ризику та необхідності проведення обробки лікарем ветеринарної медицини.

5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати препарат з іншими інсектоакарицидними препаратами.

5.8. Дози і способи введення тваринам різного віку

Препарат застосовують зовнішньо, наносячи його безпосередньо на шкіру, у місця недоступні для злизування (ділянка холки та вздовж хребта).

Препарат наносять на суху неушкоджену шкіру. Виймають піпетку з однократною дозою, розділяють шерсть тварини і наносять препарат безпосередньо на шкіру між лопатками біля основи ший.

Препарат застосовують різного фасування відповідно до мінімальної дози, яка залежить від маси тіла тварини.

Собаки, масою тіла, kg (кг)	Доза препарату, ml (мл)	Кількість піпеток, шт.
до 4	0,5	1
від 4 до 10	1,0	1
від 10 до 20	2,0	1
від 20 до 40	3,0	1
від 40 і більше	Відповідна комбінація піпеток	

Коти, масою тіла, kg (кг)	Доза препарату, ml (мл)	Кількість піпеток, шт.
до 4	0,5	1
від 4 до 8	1,0	1
від 8 і більше	Відповідна комбінація піпеток	

07.09.2023

Повторні обробки тварин проводять протягом сезонної активності паразитів за необхідності, але не раніше ніж через 4 тижні.

З метою профілактики тварин від повторного ураження ектопаразитами, необхідно періодично обробляти інсектицидними ветеринарним препаратом ІНСЕКТОСТОП спрей підстилки та засоби догляду за тваринами.

5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Препарат належить до малотоксичних для теплокровних тварин речовин і при його застосуванні у рекомендованих та збільшених в три рази дозах ознак передозування не спостерігають. Але при потраплянні препарату внутрішньо, при злизуванні препарату зі шкіри, можливе підвищене слиновиділення, блювання. При підвищеній індивідуальній чутливості і появі алергічних реакцій на препарат, його слід змити водою з миючим засобом, а при потребі призначити антигістамінні препарати.

5.10. Спеціальні застереження

Після нанесення препарату впродовж доби слід уникати попадання води (дош, купання) на місця нанесення.

Часте купання тварин із використанням шампуню після обробки тварин зменшує ефективність препарату.

Повторні обробки проводять не раніше ніж через 4 тижні.

Впродовж 24 годин після обробки тварин не потрібно гладити, спати з ними та дозволяти малим дітям бавитись з ними.

5.11. Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не визначають.

5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При роботі з препаратом дотримуватись загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами. Обробку тварин проводять з використанням гумових рукавичок. Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки теплою водою з милом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру, слизові оболонки або в очі їх необхідно промити великою кількістю проточної води.

6. Фармацевтичні особливості

6.1. Форми несумісності (основні)

Не застосовувати одночасно з іншими інсектоакарицидними препаратами.

6.2. Термін придатності

3 роки.

6.3. Особливі заходи зберігання

Зберігати препарат у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30 °С.

6.4. Природа і склад контейнера первинного пакування

Полімерні піпетки по 0,5, 1,0, 2,0 або 3,0 мл, упаковані у картонні коробки по 1 та 4 шт.

6.5. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат утилізують відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна

8. Назва та місцезнаходження виробника готового препарату

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна

9. Додаткова інформація

07.09.2023

PROFILINE краплі протипаразитарні
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
листівка-вкладка

Опис

Маслянистий, однорідний розчин від світло-жовтого до коричневого кольору, без осаду та включень.

Склад

1,0 мл препарату містить діючі речовини (мг):

фіпроніл – 100,0;

S-метопрен – 100,0.

Допоміжні речовини: пропіленкарбонат; спирт ізопропіловий; пропіленгліколь.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP53, ектопаразитоциди, інсектициди і репеленти (QP53AX65, фіпроніл комбінації).

PROFILINE краплі протипаразитарні це комбінований інсектоакарицидний ветеринарний препарат. Має виражену дію до преімагінальних та імагінальних фаз розвитку бліх (*Ctenocephalides* spp.), вошей (*Linognathus* spp.), волосоїдів (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) та іксодових кліщів (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp.), які паразитують на тілі собак і котів.

Механізм дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводять до ураження нервової системи ектопаразитів і їх загибелі. Фіпроніл не впливає на центральну нервову систему тварин.

S-метопрен – аналог ювенільного гормону, який діє як регулятор росту комах і пригнічує ріст та морфологічний розвиток їх на стадіях яйця, личинки і лялечки завдяки антагонізму з екдизоном, який відповідає за ріст та розвиток личинки.

Овоцидна дія S-метопрену проявляється в результаті прямого проникнення в оболонку відкладених яєць.

Препарат належить до малотоксичних для теплокровних тварин речовин і в рекомендованих дозах не проявляє ембріотоксичної і тератогенної дії.

Застосування

Профілактика і лікування собак та котів при ураженні ектопаразитами:

- блохами (*Ctenocephalides* spp.),
- іксодовими кліщами (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp.),
- вошами (*Linognathus* spp.),
- волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*).

Запобігає розмноженню бліх гальмуванням розвитку яєць (овоцидна активність), личинок і лялечок (ларвоцидна активність).

Профілактика та лікування собак і котів при блошиному алергічному дерматиті.

Дозування

Ветеринарний препарат застосовують зовнішньо, наносячи його безпосередньо на шкіру, у місця недоступні для злизування (ділянка холки та вздовж хребта).

Препарат наносять на суху неушкоджену шкіру. Виймають піпетку з однократною дозою, розділяють шерсть тварини і наносять препарат безпосередньо на шкіру між лопатками біля основи шиї.

Препарат застосовують різного фасування відповідно до мінімальної дози, яка залежить від маси тіла тварини.

07.09.2023

Собаки, масою тіла, kg (кг)	Доза препарату, ml (мл)	Кількість піпеток, шт.
до 4	0,5	1
від 4 до 10	1,0	1
від 10 до 20	2,0	1
від 20 до 40	3,0	1
від 40 і більше	Відповідна комбінація піпеток	

Коти, масою тіла, kg (кг)	Доза препарату, ml (мл)	Кількість піпеток, шт.
до 4	0,5	1
від 4 до 8	1,0	1
від 8 і більше	Відповідна комбінація піпеток	

Повторні обробки тварин проводять протягом сезонної активності паразитів за необхідності, але не раніше ніж через 4 тижні.

З метою профілактики тварин від повторного ураження ектопаразитами, необхідно періодично обробляти інсектоакарицидним ветеринарним препаратом ІНСЕКТОСТОП спрей підстилки та засоби догляду за тваринами.

Протипоказання

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати цуценят та кошенят віком до 8 тижнів!

Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Застосування препарату тваринам під час вагітності і лактації ґрунтується на оцінці ризику та необхідності проведення обробки лікарем ветеринарної медицини!

Застереження

Важливо переконатися, що препарат нанесений на ділянки тіла, які недоступні для злизування твариною.

Не допускати можливості облизування тваринами одне одного після обробки ветеринарним лікарським засобом.

Не рекомендують купати тварин впродовж 2-х діб після обробки ветеринарним препаратом.

Блохи від домашніх тварин часто інфікують спальні місця та інші місця перебування тварин такі як, килими і м'які меблі, тому їх необхідно періодично чистити і обробляти відповідними інсектицидними засобами. Препарат може викликати подразнення слизових оболонок, шкіри та очей. Тому не можна допускати потрапляння препарату всередину, на шкіру та в очі.

Людям із гіперчутливістю до інсектицидів або спирту не рекомендують обробляти тварин препаратом.

Не допускати потрапляння препарату на відкриті ділянки тіла (на пальці). При попаданні препарату на руки необхідно змити його водою з милом.

При випадковому попаданні препарату в очі необхідно обережно промити їх чистою водою.

Після обробки тварин препаратом необхідно ретельно вимити руки водою з милом.

Під час роботи з препаратом забороняється пити, вживати їжу або палити.

Після обробки препаратом тварин необхідно утримувати окремо до повного висихання і не допускати до них маленьких дітей. Не рекомендують обробляти тварин препаратом

07.09.2023

впродовж дня, це краще робити ввечері. Не дозволяти тваринам після обробки препаратом спати з господарями, особливо з дітьми.

Форма випуску

Полімерні піпетки по 0,5, 1,0, 2,0 або 3,0 мл, упаковані у картонні коробки по 1 та 4 шт.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому, темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна


07.09.2023

PROVET

КРАПЛІ
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ

**PROFI
LINE**


до 4 kg (кг)



1 ШТ. І 1 МІСЯЦЬ ЗАХИСТУ

ВІД БЛІХ, КЛІЩІВ,
ВОШЕЙ, ВОЛОСОЇДІВ

0,5 ml (мл)

**PROFI
LINE** КРАПЛІ ПРОТИПАРАЗИТАРНІ
ДЛЯ КОТІВ

PROVET



**РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ,
ТОЧКОВОГО НАНЕСЕННЯ**

Склад: 1,0 ml (мл) препарату містить діючі речовини:
Фіпроніл – 100 mg (мг); S-метопрен – 100 mg (мг). Допоміжні речовини:
пропіленкарбонат, спирт ізопропіловий, пропіленгліколь.

Застосування: профілактика і лікування котів при ураженні:
• блохами (*Ctenocephalides* spp.);
• іксодовими кліщами (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp.);
• вошами (*Linognathus* spp.);
• волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*);
Запобігає розмноженню бліх гальмуванням розвитку яєць (овоцидна активність), личинок і лялечок (ларвоцидна активність).
Профілактика та лікування котів при блошиному алергічному дерматиті.

Дозування: застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Протипоказання:
Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринами!
Не застосовувати цуценят та кошенят віком до 8 тижнів!
Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Форма випуску: полімерні піпетки по 0,5 ml (мл) упаковані у картонні пакування по 1 шт.

Зберігання: зберігати препарат у сухому, темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30 °C.

Термін придатності: 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення:
ТОВ «НВП «СУЗІР-Я»
вул. Полтавський шлях, 115,
м. Харків, 61093, Україна
+38 (057) 766-36-36

Виробник готового продукту:
ТОВ «НВП «СУЗІР-Я»
вул. Зернова, 4, м. Харків,
61105, Україна
Info@provet.ua
provet.ua

Прямий зв'язок з виробником:
0 (800) 21-23-40

Art. (Арт.) PR243113
РП: АВ-07790-03-18

**ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ!**




48230821431137

Серія:
Придатний до:

07.09.2023

PROVET

КРАПЛІ
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ

PROFI
LINE



4-8 kg (кг)

1,0 ml (мл)

1 ШТ. І 1 МІСЯЦЬ ЗАХИСТУ

ВІД БЛІХ, КЛІЩІВ,
ВОШЕЙ, ВОЛОСОЇДІВ

PROFI
LINE

КРАПЛІ ПРОТИПАРАЗИТАРНІ
ДЛЯ КОТІВ

PROVET



**РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ,
ТОЧКОВОГО НАНЕСЕННЯ**

Склад: 1,0 ml (мл) препарату містить діючі речовини:
Фіпроніл – 100 mg (mg); S-метопрен – 100 mg (mg). Допоміжні речови-
ни: пропіленкарбонат, спирт ізопропіловий, пропіленгліколь.

Застосування: профілактика і лікування котів при ураженні:
• блохами (*Ctenocephalides* spp.);
• іксодовими кліщами (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp.);
• вошами (*Linognathus* spp.);
• волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*);
Запобігає розмноженню бліх гальмуванням розвитку яєць (овоцидна ак-
тивність), личинок і лялечок (ларвоцидна активність).
Профілактика та лікування котів при блошиному алергічному дерматиті.

Дозування: застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Протипоказання:
Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!
Не застосовувати цуценят та кошенят віком до 8 тижнів!
Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю
до компонентів препарату!

Форма випуску: полімерні піпетки по 1,0 ml (мл) упаковані у картонні
пакування по 1 шт.

Зберігання: зберігати препарат у сухому, темному, недоступному для
дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів,
за температури від 0 до 30 °C.

Термін придатності: 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення:
ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»
вул. Полтавський шлях, 115,
м. Харків, 61093, Україна
+38 (057) 766-36-36

Виробник готового продукту:
ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»
вул. Зернова, 4, м. Харків,
61105, Україна
info@provet.ua
provet.ua

Прямий зв'язок з виробником:
0 (800) 21-23-40

Art. (Арт.): PR243112
РП: АВ-07790-03-18

**ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ!**




48230821431120

Серія:
Придатний до:

07.09.2023

PROVET

КРАПЛІ
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ

**PROFI
LINE**



до 4 kg (кг)

0,5 ml (мл)

1 ШТ. | 1 МІСЯЦЬ ЗАХИСТУ

ВІД БЛІХ, КЛІЩІВ,
ВОШЕЙ, ВОЛОСОЇДІВ

**PROFI
LINE**

КРАПЛІ ПРОТИПАРАЗИТАРНІ
ДЛЯ СОБАК

РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ,
ТОЧКОВОГО НАНЕСЕННЯ

Склад: 1,0 ml (мл) препарату містить діючі речовини:
фипроніл – 100 mg (mg); S-метопрен – 100 mg (mg). Допоміжні речовини: пропіленкарбонат, спирт ізопропіловий, пропіленгліколь.

Застосування: профілактика і лікування собак при ураженні:
• блохами (*Ctenocephalides* spp.);
• іксодовими кліщами (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp.);
• вошами (*Linognathus* spp.);
• волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*);
Запобігає розмноженню бліх гальмуванням розвитку яєць (овоцидна активність), личинок і лялечок (ларвоцидна активність).
Профілактика та лікування собак при блошиному алергічному дерматиті.

Дозування: застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Протипоказання:
Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!
Не застосовувати цуценят та кошенят віком до 8 тижнів!
Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Форма випуску: полімерні піпетки по 0,5 ml (мл) упаковані у картонні пакування по 1 шт.

Зберігання: зберігати препарат у сухому, темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30 °C.

Термін придатності: 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення:
ТОВ «НВП «СУЗІР-Я»
вул. Полтавський шлях, 115,
м. Харків, 61093, Україна
+38 (057) 766-36-36

Виробник готового продукту:
ТОВ «НВП «СУЗІР-Я»
вул. Зернова, 4, м. Харків,
61105, Україна
info@provet.ua
provet.ua

Прямий зв'язок з виробником:
0 (800) 21-23-40

Art. (Арт.) PR243109
РП: АВ-07790-03-18

**ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ!**



PROVET

Серія:
Придатний до:

07.09.2023

PROVET

КРАПЛІ
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ

**PROFI
LINE**


1,0 ml (мл)


4-10 kg (кг)



1 ШТ. | 1 МІСЯЦЬ ЗАХИСТУ

ВІД БЛІХ, КЛІЩІВ,
ВОШЕЙ, ВОЛОСОЇДІВ

**PROFI
LINE** КРАПЛІ ПРОТИПАРАЗИТАРНІ
ДЛЯ СОБАК

РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ,
ТОЧКОВОГО НАНЕСЕННЯ

Склад: 1,0 ml (мл) препарату містить діючі речовини:
фипроніл – 100 mg (мг); S-метопрен – 100 mg (мг). Допоміжні речовини:
пропіленкарбонат, спирт ізопропіловий, пропіленгліколь.

Застосування: профілактика і лікування собак при ураженні:
• блохами (*Ctenocephalides* spp.);
• іксодовими кліщами (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp.);
• вошами (*Linognathus* spp.);
• волососідами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*);
Запобігас розмноженню бліх гальмуванням розвитку яєць (овоцидна активність), личинок і лялечок (ларвоцидна активність).
Профілактика та лікування собак при блошиному алергічному дерматиті.

Дозування: застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Протипоказання:
Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!
Не застосовувати цуценят та кошенят віком до 8 тижнів!
Не застосовувати тваринам з індивідуально підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Форма випуску: полімерні піпетки по 1,0 ml (мл) упаковані у картонні пакування по 1 шт.

Зберігання: зберігати препарат у сухому, темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30 °С.

Термін придатності: 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення:
ТОВ «НВП «СУЗІР»
вул. Полтавський шлях, 115,
м. Харків, 61093, Україна
+38 (057) 766-36-36

Виробник готового продукту:
ТОВ «НВП «СУЗІР»
вул. Зернова, 4, м. Харків,
61105, Україна
info@provet.ua
provet.ua

Прямий зв'язок з виробником:
0 (800) 21-23-40

Art. (Арт.) PR243108
РП: АВ-07790-03-18

**ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ!**



4823082431083

PROVET

Серія:
Придатний до:


07.09.2023

PROVET

КРАПЛІ
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ

**PROFI
LINE**


10-20 kg (кг)



1 ШТ. І 1 МІСЯЦЬ ЗАХИСТУ

ВІД БЛІХ, КЛІЩІВ,
ВОШЕЙ, ВОЛОСОЇДІВ

2,0 ml (мл)

**PROFI
LINE** КРАПЛІ ПРОТИПАРАЗИТАРНІ
ДЛЯ СОБАК

PROVET



**РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ,
ТОЧКОВОГО НАНЕСЕННЯ**

Склад: 1,0 ml (мл) препарату містить діючі речовини:
фіпроніл – 100 mg (mg); S-метопрен – 100 mg (mg). Допоміжні речови-
ни: пропіленкарбонат, спирт ізопропіловий, пропіленгліколь.

Застосування: профілактика і лікування собак при ураженні:
• блохами (*Ctenocephalides* spp.);
• іксодовими кліщами (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp.);
• вошами (*Linognathus* spp.);
• волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*);
Запобігає розмноженню бліх гальмуванням розвитку яєць (овоцидна ак-
тивність), личинок і лялечок (ларвоцидна активність).
Профілактика та лікування собак при блошиному алергічному дерматиті.

Дозування: застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Протипоказання:
Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!
Не застосовувати цуценят та кошенят віком до 8 тижнів!
Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю
до компонентів препарату!

Форма випуску: полімерні піпетки по 2,0 ml (мл) упаковані у картонні
пакування по 1 шт.

Зберігання: зберігати препарат у сухому, темному, недоступному для
дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів,
за температури від 0 до 30 °C.

Термін придатності: 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення:
ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»
вул. Полтавський шлях, 115,
м. Харків, 61093, Україна
+38 (057) 766-36-36

Виробник готового продукту:
ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»
вул. Зернова, 4, м. Харків,
61105, Україна
info@provet.ua
provet.ua

Прямий зв'язок з виробником:
0 (800) 21-23-40

**Art. (Арт.) PR243107
РП: АВ-07790-03-18**

**ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ!**

Серія:

Придатний до:


4823082431076



07.09.2023

PROVET

КРАПЛІ
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ

PROFI
LINE



20-40 kg (кг)

3,0 ml (мл)

1 ШТ. | 1 МІСЯЦЬ ЗАХИСТУ

ВІД БЛІХ, КЛІЩІВ,
ВОШЕЙ, ВОЛОСОЇДІВ

PROFI
LINE

КРАПЛІ ПРОТИПАРАЗИТАРНІ
ДЛЯ СОБАК

РОЗЧИН ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ,
ТОЧКОВОГО НАНЕСЕННЯ

Склад: 1,0 ml (мл) препарату містить діючі речовини:
фипроніл – 100 mg (mg); S-метопрен – 100 mg (mg). Допоміжні речовини:
пропіленкарбонат, спирт ізопропіловий, пропіленгліколь.

Застосування: профілактика і лікування собак при ураженні:
• блохами (*Ctenocephalides* spp.);
• іксодовими кліщами (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp.);
• вошами (*Linognathus* spp.);
• волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*);
Запобігає розмноженню бліх гальмуванням розвитку яєць (овоцидна активність), личинок і лялечок (ларвоцидна активність).
Профілактика та лікування собак при блошиному алергічному дерматиті.

Дозування: застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Протипоказання:
Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!
Не застосовувати цуценят та кошенят віком до 8 тижнів!
Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Форма випуску: полімерні піпетки по 3,0 ml (мл) упаковані у картонні пакування по 1 шт.

Зберігання: зберігати препарат у сухому, темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30 °C.

Термін придатності: 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення:
ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»
вул. Полтавський шлях, 115,
м. Харків, 61093, Україна
+38 (057) 766-36-36

Виробник готового продукту:
ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»
вул. Зернова, 4, м. Харків,
61105, Україна
info@proveta.ua
proveta.ua

Прямий зв'язок з виробником:
0 (800) 21-23-40

Art.(Art.) PR243106
РП: АВ-07790-03-18

ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ!

PROVET





Серія:
Придатний до:







07.09.2023



07.09.2023



07.09.2023

