



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та на підставі експертного висновку 05.12.2024 № 335-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 24.12.2024 № 884 зареєстровано:

продукт СЕКСТОП суспензія

форма Суспензія для перорального застосування

Власник реєстраційного посвідчення:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Сузір'я»

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, УКРАЇНА

зареєстровано в Україні за № АВ-05373-01-14 від 24.12.2024

Виробник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Сузір'я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, УКРАЇНА

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка препарату (додаток 2);
- етикетка (додаток 3).

Реєстраційне посвідчення дійсне до: 23.12.2029

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту.

Заступник Голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів –
Головний державний ветеринарний інспектор України

Deputy Head of the State Service of Ukraine on Food Safety and
Consumer Protection – Chief State Veterinary Inspector of Ukraine



Володимир КУСТУРОВ

Volodymyr KUSTUROV

Коротка характеристика препарату

1. Назва

СЕКССТОП суспензія

2. Склад

1,0 мл препарату містить діючу речовину:

мегестролу ацетат – 20,0 мг.

Допоміжні речовини: пропіленгліколь, вода очищена, полісорбат, натрію карбоксиметилцелюлоза, желатин, лимонна кислота.

3. Фармацевтична форма

Суспензія для перорального застосування

4. Фармакологічні властивості

АТСvet QG03, гормони статевих залоз і ветеринарні препарати, які застосовують при патології статевої сфери (QG03AC05, мегестрол)

Діючою речовиною препарату є синтетичний прогестаген - мегестролу ацетат, високоефективний синтетичний прогестероноподібний гормон. Він діє на гіпоталамо-гіпофізарну систему, блокує секрецію гонадотропних гормонів аденогіпофізу. Зниження рівня гонадотропних гормонів (ФСГ і ЛГ) у крові призводить до порушення фолікулогенезу у самок і синтезу тестостерону у клітинах Лейдега у самців, внаслідок чого відбувається пригнічення статевого потягу у тварин.

При застосуванні препарату до початку тічки у самок спостерігають пригнічення секреції, гонадотропних гормонів, що попереджує овуляцію. Якщо препарат застосовують на початку фолікулярної фази (другий чи третій день тічки), це призводить до переривання тічки.

Мегестролу ацетат виявляє таку ж дію як і інші прогестагенні препарати. Має суттєву антиестрогенну та антиглюкокортикоїдну активність.

Препарат добре абсорбується із травного каналу, метаболізується у печінці і виводиться з організму, в основному, із сечею протягом 1-2 діб.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Собаки та коти (самки і самці).

5.2 Показання до застосування

Препарат має антиестрогенну та антиовуляторну дію, і застосовується для затримки або переривання тічки у сук і кішок, не впливаючи негативно на наступні вагітності. У кобелів і котів препарат гальмує статеву активність і регулює їхню поведінку.

5.3 Протипоказання

Препарат не рекомендують застосовувати тваринам із захворюваннями статевої системи (піометра, метрит, ендометрит), при пухлинах молочної залози, діабеті, нестатевозрілим тваринам, вагітним і лактуючим тваринам.

Не рекомендують застосовувати молодим самкам до першої тічки або як анестральну терапію при порушеннях статевого циклу.

Не застосовувати при підвищеній чутливості тварин до компонентів препарату!

5.4 Побічна дія

При тривалому застосуванні препарату можливі зміни статевого циклу, збільшення молочних залоз, надмірний апетит і збільшення маси тіла тварини.

5.5 Особливі застереження при використанні

Препарат застосовувати тваринам під наглядом лікаря ветеринарної медицини.

5.6 Використання під час вагітності, лактації

Не застосовувати самкам під час вагітності і лактації.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Препарат не застосовують одночасно з препаратами аналогічної дії. Рифампіцин

24.12.2024

гальмує дію препарату при одночасному застосуванні. Одночасне застосування з кортикостероїдами (тривалий період) може посилити супресію кори наднирників та викликати цукровий діабет.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Перед застосуванням збовтати!

Препарат застосовують перорально. Згодовують тварині з кормом або задають примусово безпосередньо в ротovu порожнину у дозах:

Котам:

- При появі у котів ознак статевого збудження для заспокоєння - 5 крапель на 5 kg (kg) маси тіла тварини /на добу впродовж 2 тижнів (не довше).

Кішкам:

- Для переривання тічки:
кішкам масою тіла 1-5 kg (kg) - 8 крапель щоденно;
кішкам масою тіла 6-10 kg (kg) - 10 крапель щоденно впродовж 8 діб з початку тічки. Не застосовувати, якщо з початку тічки пройшло 2 доби. Рекомендують переривати тічку не більше 2 разів на рік, якщо важко визначити початок тічки, її краще затримати, ніж переривати.

- Для затримки тічки:
кішкам масою тіла 1-5 kg (kg) - 4 краплі;
кішкам масою тіла 6-10 kg (kg) - 6 крапель кожні 2 тижні. Застосовувати так довго, на скільки бажано затримати тічку.

Сукам:

- Для переривання тічки - 20 крапель на кожні 5 kg (kg) маси тіла тварини у перші 3 доби, з 4 по 10 добу давати половину добової дози. Рекомендують застосовувати не більше 2 курсів на рік.

- Для затримки тічки - за 7-15 добу до початку тічки 6 крапель на кожні 5 kg (kg) маси тіла тварини щодня. Максимальний курс 32 доби.

Кобелі:

- Для заспокоєння статевого збудження - 20 крапель на кожні 5 kg (kg) маси тіла тварини впродовж 7 діб, починаючи не пізніше 2 доби від початку статевого збудження.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При значному передозуванні препарату у тварин виникають клінічні ознаки інтоксикації.

5.10 Спеціальні застереження Спеціальних застережень немає.

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не регламентується.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Не встановлені.

6.2 Термін придатності 3 роки.

6.3 Особливі заходи зберігання

Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей місці за температури від 4 до 25 °С.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Полімерні флакони з крапельницею по 2 мл, упаковані в картонні коробки; полімерні туби по 2 мл, упаковані в картонні коробки.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат або його залишки утилізують відповідно до чинних вимог.

24.12.2024

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.

+38(057) 766-36-36

8. Назва і місце знаходження виробника

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.

info@provet.ua

provet.ua

9. Додаткова інформація

24.12.2024

СЕКСТОП суспензія
(суспензія для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Суспензія від білого до кремового кольору.

Склад

1,0 мл препарату містить діючу речовину:
мегестролу ацетат – 20,0 мг.

Допоміжні речовини: пропіленгліколь, вода очищена, полісорбат, натрію карбоксиметилцелюлоза, желатин, лимонна кислота.

Фармакологічні властивості

АТСВЕТ QG03, гормони статевих залоз і ветеринарні препарати, які застосовують при патології статевої сфери (QG03AC05, мегестрол)

Діючою речовиною препарату є синтетичний прогестаген - мегестролу ацетат, високоефективний синтетичний прогестероноподібний гормон. Він діє на гіпоталамо-гіпофізарну систему, блокує секрецію гонадотропних гормонів аденогіпофізу. Зниження рівня гонадотропних гормонів (ФСГ і ЛГ) у крові призводить до порушення фолікулогенезу у самок і синтезу тестостерону у клітинах Лейдега у самців, внаслідок чого відбувається пригнічення статевих потягу у тварин.

При застосуванні препарату до початку тічки у самок спостерігають пригнічення секреції, гонадотропних гормонів, що попереджує овуляцію. Якщо препарат застосовують на початку фолікулярної фази (другий чи третій день тічки), це призводить до переривання тічки.

Мегестролу ацетат виявляє таку ж дію як і інші прогестагенні препарати. Має суттєву антиестрогенну та антиглюкокортикоїдну активність.

Препарат добре абсорбується із травного каналу, метаболізується у печінці і виводиться з організму, в основному, із сечею протягом 1-2 діб.

Застосування

Препарат має антиестрогенну та антиовуляторну дію, і застосовується для затримки або переривання тічки у сук і кішок, не впливаючи негативно на наступні вагітності. У кобелів і котів препарат гальмує статеву активність і регулює їхню поведінку.

Дозування

Перед застосуванням збовтати!

Препарат застосовують перорально. Згодовують тварині з кормом або задають примусово безпосередньо в ротову порожнину у дозах:

Котам:

• При появі у котів ознак статевих збудження для заспокоєння - 5 крапель на 5 kg (кг) маси тіла тварини /на добу впродовж 2 тижнів (не довше).

Кішкам:

• Для переривання тічки:

кішкам масою тіла 1-5 kg (кг) - 8 крапель щоденно;

кішкам масою тіла 6-10 kg (кг) - 10 крапель щоденно впродовж 8 діб з початку тічки. Не застосовувати, якщо з початку тічки пройшло 2 доби. Рекомендують переривати тічку не більше 2 разів на рік, якщо важко визначити початок тічки, її краще затримати, ніж переривати.

• Для затримки тічки:

кішкам масою тіла 1-5 kg (кг) - 4 краплі;

кішкам масою тіла 6-10 kg (кг) - 6 крапель кожні 2 тижні. Застосовувати так довго, на скільки бажано затримати тічку.

Сукам:

• Для переривання тічки - 20 крапель на кожні 5 kg (кг) маси тіла тварини у перші 3 доби, з 4 по 10 добу давати половину добової дози. Рекомендують застосовувати не більше 2 курсів на рік.

• Для затримки тічки - за 7-15 добу до початку тічки 6 крапель на кожні 5 kg (кг) маси тіла

24.12.2024

тварини щодня. Максимальний курс 32 доби.

Кобелі:

- Для заспокоєння статевого збудження - 20 крапель на кожні 5 kg (кг) маси тіла тварини впродовж 7 діб, починаючи не пізніше 2 доби від початку статевого збудження.

Протипоказання

Препарат не рекомендують застосовувати тваринам із захворюваннями статевої системи (піометра, метрит, ендометрит), при пухлинах молочної залози, діабеті, нестатевозрілим тваринам, вагітним і лактуючим тваринам.

Не рекомендують застосовувати молодим самкам до першої тічки або як анестральну терапію при порушеннях статевого циклу.

Не застосовувати при підвищеній чутливості тварин до компонентів препарату!

Застереження

При тривалому застосуванні препарату можливі зміни статевого циклу, збільшення молочних залоз, надмірний апетит і збільшення маси тіла тварини.

Препарат застосовувати тваринам під наглядом лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Полімерні флакони з крапельницею по 2 мл, упаковані в картонні коробки, полімерні туби по 2 мл, упаковані в картонні коробки.

Зберігання

Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей місці за температури від 4 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,
вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.
+38(057) 766-36-36

Назва і місце знаходження виробника

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»
вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.
info@provet.ua
provet.ua

24.12.2024



<p>СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ</p> <p>Склад: 1,0 мл (мл) препарату містить діючу речовину: мегестролу ацетат – 20,0 мг (mg).</p> <p>ЗАСТОСУВАТИ ЗГІДНО З ЛИСТІВКОЮ-ВКЛАДКОЮ</p>	 <p>СЕКС СТОП</p> <p>PROVET</p> <p>2 мл (мл)</p>	<p>ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ!</p> <p>Арт. (Art.) PR020029 РП: АВ-05373-01-14</p> <p>Серія:</p> <p>Придатний до:</p> <p>Термін придатності: 3 роки.</p>
--	--	--

ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАНУ

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів
та захисту споживачів

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
КОНТРОЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНИХ
ПРЕПАРАТІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ
ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК

вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019
тел.: (032) 252 82 84; факс: (032) 252 11 93
e-mail: agency@scivp.lviv.ua www.scivp.lviv.ua
ЄДРПОУ 00485670



The State Service of Ukraine on Food Safety and
Consumer Protection

STATE SCIENTIFIC RESEARCH CONTROL
INSTITUTE OF VETERINARY MEDICAL
PRODUCTS AND FEED ADDITIVES

AGENCY OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS
AND FEED ADDITIVES

Donetska str., 11, Lviv, 79019, Ukraine
tel.: +38 032 252 82 84; fax: +380 32 252 11 93
e-mail: agency@scivp.lviv.ua www.scivp.lviv.ua
EDRPOU 00485670

05.12.2024 № 335-К/06

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА УКРАЇНИ

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково виробниче підприємство «Сузір'я»,
УКРАЇНА**

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами наукової експертизи реєстраційного досьє та аналітичних випробувань препарату
СЕКССТОП суспензія

власник Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Сузір'я»,
(УКРАЇНА)

виробник Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Сузір'я»,
(УКРАЇНА)

згідно з контрактом № 102 від 20.05.2024 р.

За результатами проведеної наукової експертизи реєстраційного досьє та випробувань
препарату СЕКССТОП суспензія, Суспензія для перорального застосування, власник Товариство з
обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Сузір'я», (УКРАЇНА), виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Сузір'я»,
(УКРАЇНА) рекомендовано його перереєстрацію в Україні.

Реєстраційне посвідчення: АВ-05373-01-14

**Директор Інституту,
д.вет.наук, професор,
член-кореспондент НААН**

**Голова Агентства,
доктор філософії**

Володимир СТИБЕЛЬ

Микола ВЕРХОЛЮК